

usmodi ustilaginem habent r) et iisdem causis imputari debent. Ex. gr. *Carex ustulata*, *pedata*, *pulla*, et *vesicaria* var. capsulis atrofuscis etc. (vide infra).

## §. 24.

Exempla pubescentiæ plantarum, ex siccitate ortæ, præter supra allata, pauca addere libet. *Veronica scutellata* β. *villosa*, etiam Lapponiæ locis exsiccatis; *Avena subspicata* α. (β. vide infra). *Plantago lanceolata* foliis maxime villosis, etiam Norvegiæ ad Indals-berget. *Myosotides* pleræque, ut supra dictum, glabrescunt in aqua, locis aridis pubescunt. *Primula farinosa* α.; nam β. *stricta* glabrescit in Lapponia, quia inundata aqua. *Statice Armeria* β; (nisi superioris §.). *Ranunculus repens* et *acris*, in siccis pilosi; juxta aquam glabrati. *Draba hirta*, in rupibus siccissimis foliis stellato-pubescentibus est; ad rivulos alpinos glabrescit. *Lathyrus pratensis* var. *lanuginosus* Fries Nov. etiam Angermanniæ. *Hieracium dubium* var. *strigosum*, (Læst. V. A. H. 1823) s). *Hieracium murorum*, var. *incisum*, aliæque formæ montanæ et apricoriæ: nam in ri-

r) *Sal. lanata*, *limosa*, *nigricans*, *glauca*, ramulis interdum glabris, sed adustis observantur.

s) Folia radicalia obovata; pili lutescentes; flores exacte umbellati. Num itaque *H. cymosum* β.? Fries Nov. Ed. 2. Annon potius V?