

simum est; unde forma hæc qua spicam gracilior, sed qua folia maxime luxurians. *Plantago lanceolata* var. *altissima* LiljebL., *Campanula rotundifolia* var. *graminifolia* foliis caulinis gramineis, longissimis; laciniis calycinis setaceis corollam æquantibus; loco nimis pinguido et umbroso, Nordlandiæ, Romdalen. *Stellaria graminea* var. *pinguida*, foliis lanceolatis etc. (vide supra p. 261 not. u); folia hujus dilatari videmus loco nimis pinguido, quod in aprico nascitur. Sin autem in occultis ac umbrosis esset, profecto folia totamque plantam attenuari videremus, sicut var. Campan. supra commemorata.

Huc pertinent, *Rubus arcticus* var. *caule bi-trifloro* et var. *flore pleno*, locis pinguidis; *Hieracium murorum* maxima forma, caule superne ramosissimo, et *Hieracium alpinum*, caule subramoso et folioloso, nec non elongato: (*Hieracium alp.* var. *fuliginosum*, Læst. V. A. H. 1826), locis pinguidis etiam in ipsis alpibus, quo greges rangiferini pernoctarunt; unde Fig. in Sv. Bot. Tab. 644 fere solito major, quia typus e loco fertiliori erat. In desertis autem Lapponiæ sterilissimis, quo non licet aliis, quam Licheni rangiferino luxuriose vivere, *Hieracium alpinum*, ut multa alia, simplex, abbreviatum, scapo etiam nudo, obvenit. Pari modo *Hieracium sylvaticum* (*boreale* Horn.) locis ferti-